


Particella 139



1 : 5.000

particella forestale

139

classe colturale

A

<i>Località:</i>	Colle delle Grotticelle	<i>Esposizione</i>	S, SE, SO, O
<i>Data rilevamento</i>	08/09/2014	<i>Superficie totale (ha):</i>	8,93.35
<i>Altitudine</i>	730 (da 693 a 785)	<i>Superficie boscata (ha):</i>	8,70.94

Posizione e giacitura: versante. **Pendenza media del terreno:** 20%. **Rocciosità:** localizzata e abbondante (parte alta della particella). **Pietrosità:** localizzata e abbondante. **Accidentalità:** assente. **Erosione:** scarsa all'interno della particella e incanalata e profonda lungo le piste che la delimitano e lungo la pista di strascico secondaria localizzata nella parte medio bassa della particella. **Franosità:** assente. **Ristagni idrici:** assenti. **Suolo:** profondo su gran parte della particella, superficiale nella parte alta della stessa (zona di dislivello).

Infrastrutture, viabilità, accessibilità

Strade trattorabili ai confini sud e nord.

Piste di strascico principale ai confini ovest e nord-est.

Pista di strascico secondaria nella parte centrale della particella.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Vecchio rudere nella parte alta al confine con la particella 140.

Esbosco

Con mezzi meccanici.

Soprassuolo

Su gran parte della particella ceduo matricinato di castagno (85%) con nocciolo (10%) e sporadico acero d'Ungheria, cerro e acero di monte. Nella parte alta aumenta la mescolanza con orniello, acero d'Ungheria, rovere, cerro, tiglio e sporadico sorbo domestico che affiancano il castagno. Struttura monoplana, a tratti biplana per la presenza del nocciolo sul piano dominato. Densità colma con grado di copertura del 95-100% su gran parte della particella; tendente al rado nell'area in cui la composizione è più mista.

Vigore discreto, stato fitosanitario mediocre per la presenza del cancro corticale. Età 32 anni.

Dimensioni indicative: polloni di 20-25 cm di diametro e 17-20 m di altezza. Numero di polloni per ceppaia: 2-4. Matricine di 40-45 cm di diametro e 18-20 m di altezza. Distanza tra le matricine di 10-12 m.

Novellame scarso e sporadico di castagno e acero d'Ungheria. Rinnovazione diffusa e scarsa di acero d'Ungheria, acero di monte, acero campestre e pioppo tremolo.

Sottobosco arbustivo diffuso e moderato di rovo (specie plurime), corniolo, ginestra dei carbonai, *Euonymus europaeus* e biancospino.

Sottobosco erbaceo diffuso e moderato di graminacee, sigillo di Salomone, edera, viola, ciclamino, felce aquilina, euforbia.

Interventi precedenti

Diradamento.

Interventi prescritti

Ceduazione nel primo periodo (s.s. 2020-2021).

Tipo di rilievo

Campionamento relascopico adiametrico.

Aree relascopiche

Fattore di numerazione: 1

$G_1=23 \text{ m}^2/\text{ha}$ (castagno)

$G_2=25 \text{ m}^2/\text{ha}$ (castagno)

Note

Nella parte alta della particella a nord del rudere presente un grosso esemplare di sorbo domestico (50 cm di diametro e circa 18 m di altezza).

Dati catastali	
Foglio	Mappale
24	5p
28	3p

Dati dendrometrici aggiornati a gennaio 2019								
Classe di fertilità 3								
Età	Provvigione [m ³ ha ⁻¹] (Polloni + Matricine)	Provvigione [m ³ ha ⁻¹] (Polloni)	Provvigione Totale [m ³] (Polloni + Matricine)	Provvigione Totale [m ³] (Polloni)	Ripresa	Ripresa Totale	Ripresa	Ripresa Totale
					[m ³ ha ⁻¹]	[m ³]	[m ³ ha ⁻¹]	[m ³]
					I intervento		II intervento	
36	339	291	2951	2533	273	2380		